

Приложение №1
 К приказу № 182-2021
 От «24» 09 2021 г.

ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора
 М. Водный стадион, ул. Адмирала Макарова, д. 10
 Тел. 380-20-19, 459-17-18, 8-905-546-59-33, 8-905-546-59-35, 8-905-546-59-51
 Лицензия № ФС-99-01-009026 от 26 марта 2015 г.


ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕЙСКУРАНТУ ЦЕН от 07.06.2021г.
 (действительно с «27» 09 2021 г.)

| Название анализа | Клинический материал | Результат | Срок выполнения | Цена (руб.) |
|--|--|-----------|-----------------|-------------|
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | | | | |
| Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | кровь (сыворотка) | кол. | 6 к.д. | 3100-00 |
| Прокальцитонин (PCT) | кровь (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 3750-00 |
| Тропонин I (Cardiac-specific Troponin I), высокочувствительный метод | кровь (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 1275-00 |
| Креатинкиназа-MB (Creatine Kinase-MB) | кровь (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 820-00 |
| Холестерин, холестерин липидов низкой плотности, холестерин липидов высокой плотности, холестерин липидов очень низкой плотности*, индекс атерогенности*, триглицериды | кровь (сыворотка) | кол. | 2 к.д. | 1255-00 |
| ИММУНОЛОГИЯ | | | | |
| Интерлейкин 6 | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 1750-00 |
| АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА | | | | |
| Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG; качественное определение | кровь (сыворотка) | кач. | 3 к.д. | 2380-00 |
| ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | | | | |
| РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение Результат на русском и английском языках (по запросу) | Мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | Кач. | 1 к.д. | 2150-00 |
| Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM, IgG, на наличие IgG-антител к Spike-белку (белку шипа) и суммарных IgM-антител к Spike-белку и N-белку (белку нуклеокапсида) | кровь (сыворотка) | Кач. | 1-4 к.д. | 2100-00 |
| Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, на наличие IgG-антител к Spike-белку (белку шипа) | Кровь (сыворотка) | Кач. | 1-4 к.д. | 1050-00 |
| Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, на наличие IgG-антител к Spike-белку (белку шипа) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1-4 к.д. | 1280-00 |

* - определяется расчетным путем.

При значениях триглицеридов более 10,36 ммоль/л использование расчетного метода для холестерина липидов очень низкой плотности не рекомендуется.

Руководитель КДЦ



В.А.Алешкин

Гл. бухгалтер



И.В.Бакандова